


TUMORES DO COLO DO ÚTERO

Entre 2000 e 2006 foram diagnosticados 1582 casos de tumores do colo do útero (C53) na Região Norte de Portugal (98,4% com informação de *follow-up*). A sobrevivência relativa global a 5 anos foi de 63,9% (ajustada para a idade) enquanto a média europeia (EUROCARE-4) foi de 60,4%.


Sobrevivência global



Mulheres

Anos após diagnóstico	Total	
	abs	rel
1 ano	88,1	89,1
3 anos	70,2	72,8
5 anos	63,9	68,0
nº casos	1557	


Sobrevivência por Grupo Etário



Mulheres

Anos após diagnóstico	15-44		45-54		55-64		65-74		75+		Total	
	abs	rel	abs	rel	abs	rel	abs	rel	abs	rel	abs	rel
1 ano	92,8	92,9	92,3	92,5	91,2	91,6	87,8	88,8	61,7	66,3	88,1	89,1
3 anos	82,6	82,8	77,4	77,9	71,8	72,8	63,4	65,9	26,4	33,5	70,2	72,8
5 anos	79,9	80,3	70,9	71,7	64,1	65,7	51,3	55,2	20,4	31,5	63,9	68,0
nº casos	501		375		261		245		175		1557	

Sobrevivência relativa a 5 anos - países europeus*



* Verdecchia A, Francisci S, Brenner H et al. Recent cancer survival in Europe: a 2000-02 period analysis of EUROCARE-4 data. Lancet Oncol 2007;8:784-796.

Informação adicional

Esta folha informativa foi preparada pelo Registo Oncológico Regional do Norte (RORENO). Para informações adicionais sobre cancro na Região Norte ou sobre as metodologias usadas, por favor contacte o RORENO através do telefone 225 084 067 ou pelo email roreno@ipoporto.min-saude.pt.

Saiba mais em www.roreno.com.pt

Ano de publicação: 2011